

Лекция №2

Теорема Минковского QR-ФАКТОРИЗАЦИЯ

I. Теорема Минковского.

Теорема 1 (Т-МА Минковского)

Для решетки $L \subseteq \mathbb{R}^d$ ранга d справедливы:

$$\begin{aligned} 1) \lambda_1(L) &\leq \sqrt{d} \cdot (\det L)^{1/d} & \left\{ \lambda_1(L) = \min_{b \in L \setminus \{0\}} \|b\|_2 \right\} \\ 2) \lambda_1^\infty(L) &\leq (\det L)^{1/d} & \left\{ \lambda_1^\infty(L) = \min_{b \in L \setminus \{0\}} \|b\|_\infty \right\} \\ & & \| \cdot \|_\infty = \max_i |b_i| \end{aligned}$$


Для док-ва теоремы Минковского $\neq 2$ другие теоремы.

Теорема 2] $S \subseteq \mathbb{R}^d$ - симметричное, выпуклое м-во, что $\text{vol}(S) > 2^d \det L$
Тогда S содержит ненулевой вектор L .

Т-МА 2 \Rightarrow Т-МА Минковского

$$S = \left[-(\det L)^{1/d}, (\det L)^{1/d} \right]$$

$$\text{vol}(S) = \left(2 \cdot (\det L)^{1/d} \right)^d = 2^d \det L$$



$\forall S \exists b \in L \setminus \{0\}$ и $\|b\|_\infty < (\det L)^{1/d} \Rightarrow$ вы помещается (2)

$\|b\|_2 \leq \sqrt{d} \cdot \|b\|_\infty \Rightarrow \|b\|_2 \leq \sqrt{d} (\det L)^{1/d} \Rightarrow$ вы помещается (1)

Теорема 3 (Блихфельд) $L \subseteq \mathbb{R}^d$ - решетка, $E \subseteq \mathbb{R}^d$, т.ч. $\text{vol}(E) > \det(L)$:

Тогда $\exists a_1, a_2 \in E$, т.ч. $a_1 - a_2 \in L$,
 $a_1 \neq a_2$


T-MA 3 ⇒ T-MA 2

В качестве $E = \frac{S}{2}$; Тогда $\text{Vol}(E) = \frac{\text{Vol} S}{2^d} > \det L$.

∃ $a_1, a_2 \in E$, т.ч. $a_1 - a_2 \in L$.

Покажем, $a_1 - a_2 \in S$. $a_1 - a_2 = 2 \cdot \frac{a_1 - a_2}{2} = \frac{1}{2} (2a_1 - 2a_2)$;


$a_1, a_2 \in E \Rightarrow 2a_1, 2a_2 \in S$;
 $-2a_2 \in S$ (S-симметр.)



ДОК-ВО ТЕОРЕМЫ 3

∑_{b ∈ L} U{P + b} - это разбиение \mathbb{R}^d (tiling)

$E = \coprod_{b \in L} \{E \cap P + b\}$
 непересекающиеся
 множества




$\det L = \text{Vol}(L) < \text{Vol}(E) = \sum_{b \in L} \text{Vol}(E \cap P + b)$
 (по условию T-MA1)

$\text{Vol}(L) < \text{Vol}(E) = \sum_{b \in L} \text{Vol}(\underbrace{(E - b) \cap P}_{\text{содержится в } P})$

∃ $b_1 \neq b_2 \in L$, т.ч.

$((E - b_1) \cap P) \cap ((E - b_2) \cap P) \neq \emptyset$

Возьмем $a \in ((E - b_1) \cap P) \cap ((E - b_2) \cap P)$




$a_1 = \underbrace{a + b_1}_E, a_2 = \underbrace{a + b_2}_E, a_1 - a_2 = \underbrace{b_1 - b_2}_{\in L} \in L$ ▶ $E \cap P + 0$

II Построение решёток из кодов

Опр. 1 Конструкция "A": C -линейный $[m, n, q]$ -код (т.е. $C = G \cdot x, x \in \mathbb{Z}_q^n$)



Определим $L(C) = L(G) = C + q\mathbb{Z}^m = G\mathbb{Z}_q^n + q\mathbb{Z}^m$



$$G = \begin{matrix} n \\ m-n \end{matrix} \begin{bmatrix} G_{\text{top}} \\ \hline G_{\text{bot}} \end{bmatrix}$$

Положим $G_{\text{top}} \in \mathbb{Z}_q^{n \times n}$ - ОДРАТУМА. Тогда $G \cdot G_{\text{top}}^{-1} = \begin{bmatrix} I_n \\ \hline G_{\text{bot}} \cdot G_{\text{top}}^{-1} \end{bmatrix}$

$$\left[\begin{array}{c|c} I_n & qI_m \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{c|c} I_n & 0 \\ \hline G_{\text{bot}} \cdot G_{\text{top}}^{-1} & qI_{m-n} \end{array} \right]$$

БАЗИС $L(C)$

$$\dim L(C) = m$$

$$\det(L(C)) = q^{m-n}$$

По t -ме Минковского, $\lambda_1^\infty \leq (\det L)^{\frac{1}{\dim}} = q^{\frac{m-n}{m}} = q^{1-\frac{n}{m}}$

ТЕОРЕМА 4 (Минковский - Хлабка)

C С ВЕРОЯТНОСТЬЮ $\geq 1 - 2^{-m}$ (наз случайным выбором $G \in \mathbb{Z}_q^{m \times n}$):

$$\lambda_1^\infty(L(C)) \geq \frac{1}{4} \cdot q^{1-\frac{n}{m}}$$

III РЕДУКЦИЯ БАЗИСА РЕШЕТКИ: НАЧАЛО.

III.1 Смысл: нахождение "хорошего" представления базиса решетки.

HNF (Hermit Normal Form) эрмитова нормальная форма

$$\forall B \in \mathbb{Z}^{n \times k} \quad \exists U \in GL_k(\mathbb{Z}) \text{ т.ч. } B \cdot U = \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & \dots & 0 & \\ x & & & \\ & x & & \\ & & x & \\ & & & x \end{array} \right] \cdot 0$$

коэфф-ты в строке с эл-том x на i -м месте или лежат в интервале $[0, x)$.

Полученная матрица для B уникальна и носит название HNF формы B .

Находятся HNF аналог. "Гауссову" преобразованию, где деление заменено на НОД.

Приложение: B_1, B_2 - базисы $L_1, L_2 \in \mathbb{Z}^n$, HNF позволяет вычислить базис $L_1 + L_2 \subseteq B, \mathbb{Z}^n + B_2 \mathbb{Z}^n$, а именно HNF $(B, \|B_2)$.

сложность вычисления: $O(\max(n, k)^{\omega+1} \cdot \lg \max \|b_i\|)$ - дет. сложность
 ω - конт. умножения матриц;

III.2 QR - ФАКТОРИЗАЦИЯ

$$Q \cdot Q^T = Q^T \cdot Q = Id$$

ОТР 1 $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ($\det B \neq 0$). $\exists Q$ - ортогональная и R - ДАЯ, т.ч.

$$B = Q \cdot R \quad [B] = [Q] \cdot [R], \quad r_{ii} > 0 \quad \forall i.$$

Такая декомпозиция уникальна.

Смысл Q :




QR ФАКТОРИЗАЦИЯ СВЯЗАНА С ПРОЦЕССОМ ОРТОГОНАЛИЗАЦИИ

ГРАМ-ШМИДТА (ГШ)

$$b_1^* = b_1$$

$$b_i^* = b_i - \sum_{j < i} \mu_{ij} b_j^*, \quad \mu_{ij} = \frac{\langle b_i, b_j^* \rangle}{\|b_j^*\|^2}$$

$$\mu_{ii} = 1$$



ортогональные в \mathbb{R}

$$B = Q \cdot R = \underbrace{Q}_{B^*} \cdot \text{diag}(r_{ii}) \cdot \underbrace{\text{diag}(r_{ii})^{-1}}_{(\mu_{ij})^T} \cdot R$$

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ b_1^* & & \\ \vdots & \dots & \\ 1 & & \end{bmatrix}$$

Замечание

QR и ГШ несут одну и ту же информацию о решётке

Q, R не обязаны быть рациональными, B^*, μ — рациональные для $B \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ и их дробная часть числ./знамен.

э-т в B^*, μ — $\text{poly}(\lg(b_{ij}))$.

Сложность $O(n^3)$ арифм. операций \rightarrow точно в ГШ
 \hookrightarrow приближ. в QR.

В упр:

$$1) \forall x: \|Bx\| = \|Rx\| \quad (B=QR)$$

$$2) B=QR \quad \lambda_1(L(B)) \geq \min_i(r_{ii})$$